


FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS MUSCULO ESQUELETICAS

Laura Maria Carvalho de Mendonça
Reumatologia – UFRJ
@lauramendonca_osteometabolismo



O que é avaliado pela Reumatologia?

- Tendinites
- Bursites
- Artrose
- Osteoporose
- Dores na coluna
- Artrite reumatoide
- Lupus
- Espondilite anquilosante
- Artrite psoríase
- Fibromialgia
- Etc



Como reconhecer, evitar ou tratar
algumas dessas patologias?...




Artrose ou Osteoartrite

- Mulher, 70 anos, dores nos joelhos após ficar vendo televisão por algumas horas.
- As dores aliviam após andar por alguns minutos, mas tornam a aparecer se insiste na caminhada e anda por distâncias moderadas .
- Os joelhos geralmente não ficam quentes, mas isso já aconteceu uma vez : ficou quente, inchado e com liquido dentro.
- Os joelhos crepitam e são um pouco desalinhados.



Osteoartrite: sintomas e sinais

- Dor relacionada com o uso
- Dor fica mais evidente durante o dia
- Rigidez matinal mínima (< 20 min) e após inatividade
- Proliferação óssea (bicos de papagaio)
- Limitação de movimento





FATORES DE RISCO

- Sedentarismo
- Obesidade
- Síndrome Metabólica
- Desvios Angulares
- Sarcopenia

Tratamento da OA

- Diminuir a dor para aumentar a função
- Exercício progressivo para
 - Aumentar a função
 - Aumentar a resistência e a força
 - Reduzir riscos de quedas
- Educação do paciente:
 - Perda de peso
 - Orientação postural
- Analgésicos
- Anti inflamatórios na crise aguda
- Fisioterapia/Acupuntura

Tratamentos Artrose



Tratamento farmacológico

- Analgésicos e anti-inflamatórios
- Corticosteróides intra-articular
- Ácido hialurónico intra-articular
- Sulfato de glicosamina e/ou de condroitina



Tratamento não-farmacológico

- Perda de peso
- Fisioterapia
- Terapia ocupacional
- Medicinas "verdes" (fitoterapia, acupuntura...)

Osteoartrite: alguns medicamentos de longo prazo

- Glucosamina +/- sulfato de condroitina: Benefício sintomático, sem efeitos colaterais conhecidos e ensaios controlados de longo prazo não-disponíveis
- Diascereína - (diminui a perda do espaço articular ao longo de três anos)
- Hidroxicloroquina
- Extrato insaponificável do abacate
- Peptídeos do colágeno



Garra do Diabo –
Hapargosideo
Permear, Arpadol, etc...




Boswellia serrata
Vedica, etc...



Curcuma
Curc, Mottore, etc

Colágeno hidrolisado e tipo II
Motilex, Condres, etc

Estrutura das fibras do colágeno fibrilar da cartilagem





Osteoporose

- Mulher, 76 anos, dor crônica na região dorsal da coluna. Há alguns dias essa dor piorou.
- As dores não aliviam com repouso no leito e acordam a paciente à noite.
- Perdendo altura progressivamente (4 cm) .
- Ficando um pouco corcunda. A professora de pilates sempre recomenda que ela coloque os ombros para trás.
- Tem tido muita constipação e tudo que come a deixa meio “empanzinada “.



Osteoporose

- **Fragilidade óssea = FRATURA!**




Fatores de Risco

Fatores Maiores:


- Sexo Feminino;
- Raça branca
- Idade avançada em ambos os sexos;
- História materna de fratura do colo femoral e/ou osteoporose;
- Menopausa precoce;
- Tratamento com corticóides ou outras drogas que induzem perda de massa óssea;



Fatores de Risco Clínico para Baixa Massa Óssea



- Ser mulher
- Baixo peso corporal
- Sarcopenia
- Idade Avançada
- Menopausa precoce
- Doenças secundárias: AR, DM tipo I e II, SIDA, Hipertireoidismo, etc
- Uso de glicocorticoide



- Tabagismo
- Cálcio alimentar baixo
- Ingestão de álcool >3 d/dia
- Fratura Prévia
- História familiar de Osteoporose ou fratura por fragilidade em parente de 1º Grau



OBJETIVOS DO TRATAMENTO

- **Alívio dos sintomas**
 - Controle da dor
 - Tratamento da fratura
- **Recuperar a função**
- **Prevenir novas fraturas**
 - Evitar perda de massa óssea
 - Evitar quedas





ORIENTAÇÕES PARA CONTROLE DA OSTEOPOROSE

Alimentação Saudável

Adequado aporte de cálcio e vitamina D :

- Cálcio = 1000 a 1200mg/dia
- Vitamina D = 800 a 2000UI/dia

CÁLCIO

INSTITUTE OF MEDICINE OF THE NATIONAL ACADEMIES





	Crianças		Adultos					Gestantes/Lactantes	
idade	1-3	4-8	9-18	19-51	51-70	51-70*	≥ 71	≤ 18	≥ 18
mg/dia	700	1000	1.300	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300	1.000

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: maximizar o pico de massa óssea

ADULTOS: Manutenção de massa óssea

IDOSOS: Minimizar a perda de massa óssea

CÁLCIO ALIMENTAR



Alimento	Porção	Cálcio (mg)	% Cálcio absorvido	Absorção estimada (mg)	Porções necessárias + 1 copo leite
Leite Integral	1 copo (240 g)	300	32	96	1
Iogurte	1 copo (240 g)	300	32	96	1
Queijo Branco	1 fatia média (30g)	300	32	96	1
Feijão	½ copo cozido	41	24	10	9.7
Couve	½ copo coz	61	49	30	3.2
Brócoli	½ copo coz	35	61	22	4.5
Espinafre	½ copo coz	115	5	6	16.3

Adaptado de: Buzinaro EF, et al. Arq Bras Endocrinol Metab. 2006;50(5):852-61;

Risco para Quedas e Fraturas



Risco de quedas:

- *Sarcopênicos*
- *Déficit visual*
- *Hipovitaminose D*
- *Doenças crônicas mal acompanhadas*
- *Déficit locomoção*
- *Excesso de medicações psicotrópicas, hipotensoras...*
- *Número menor de cuidadores*
- *Serviços domésticos não usuais*






Então, vamos evitar as quedas!



Proteção!!

Gerenciar a Sarcopenia




https://www.physio-pedia.com/Physical_Activity_and_COVID-19

www.reumatologia.org.br = Exercícios em casa

Fibromialgia

- Paciente sexo feminino, 56anos, com queixa de dores difusas no corpo. Parecem ser musculares ou as vezes articulares. Não tem hora para aparecer.
- As articulações não ficam inchadas.
- Dorme mal, acorda cansada.
- Sempre meio irritada, qualquer coisa fica chorosa.
- Não tem vontade de sair






Fibromialgia – Tratamento

- Tratar Depressão
- Exercícios físicos
- Normalizar o Sono
- Relaxantes musculares




Lombalgia (dor nas costas)

- Lombalgia é uma das dez principais causas de procura à serviços médicos e por dias de trabalho perdidos.²
- Cerca de 4 em cada 5 pessoas terão lombalgia pelo menos uma vez na vida




Lombalgia (dor nas costas)

- Principais causas:
 - Mover-se, sentar-se ou andar incorretamente;
 - Falta de exercícios frequentes;
 - Causas hereditárias;
 - Tabagismo;
 - Excesso de peso;
 - Osteoporose;
 - Carregar excesso de peso ou de forma inadequada.





Cervicalgia (Dor no pescoço)

- O pescoço é a parte superior da coluna, formada por 7 vértebras (C1 a C7), separadas pelos discos que amortecem impactos causados pelos movimentos.
- A dor pode acontecer na região do pescoço, atrás da cabeça, na parte alta das costas ou irradiar-se para os braços, acompanhada ou não de formigamentos.⁴




Fraturas, Luxações, Entorse



- Fratura é resultado do excesso de carga no osso.⁵
- Luxação é a perda de contato entre os ossos de uma articulação.⁵
- Entorse: torção dos ligamentos de uma articulação, com estiramento ou ruptura dos mesmos.⁵



LOMBALGIA POSTURAL



Problemas Posturais



Prevenção

- A coluna tem a capacidade de armazenar traumas ao longo do tempo, sem apresentar nenhum sintoma. Deve-se tentar **mudar os hábitos incorretos** que produzem lesões nas estruturas da coluna.

Escolha da cadeira adequada

- Cadeira com dimensões apropriadas para o corpo.
- 2 pés apoiados no chão
- assento firme e profundo para suportar as coxas, não forçando o ângulo posterior dos joelhos
- apoio para os antebraços
- bordas anteriores do assento devem ser arredondadas.



POSIÇÃO CORRETA NO COMPUTADOR



Como levantar corretamente



- **Certo:** inclinar o corpo para frente sem tensionar os músculos do pescoço e costas, estender os joelhos enquanto leva a cabeça e o tronco para frente e para cima, até chegar à posição em pé

Dormindo - Má postura



- A pior posição é em decúbito ventral

DORMINDO

- Uma posição que inicialmente se mostra confortável, se mantida por um tempo prolongado pode causar dor. A posição deitado de lado é a posição mais adequada para quem sofre de dores no pescoço e costas.



Forma Correta de Levantar da Cama

- **A-girar o corpo para o lado**
- **B-Colocar as pernas para fora da cama**
- **C-Sentar na cama**



Forma Incorreta de Levantar da Cama



Travesseiros

- O travesseiro deve ser de uma altura suficiente para manter a coluna cervical alinhada com a coluna dorsal.
- Colocar um ou dois travesseiros até que sinta a cabeça alinhada.
- Para deitar de lado, a distância da extremidade do ombro e a cabeça determina o número de travesseiros necessários.



Colchões

- A dureza do colchão deve ser suficiente para suportar o peso do corpo e não comprimir as saliências ósseas.
- Colchões ditos "ortopédicos" são muito duros e podem causar lesões por comprimir as saliências ósseas.
- Indivíduos mais pesados necessitam de colchão com alta densidade de espuma
- Indivíduos mais leves- espumas menos densas.

Levantando peso




- O levantar peso de forma incorreta pode ser a causa do desencadeamento de uma dor lombar aguda.

Artrite Reumatoide

- Paciente sexo feminino 64 anos, com queixa de dores nas articulações das mãos: punhos e dedos, pior pela manhã.
- Sente uma rigidez para mover os dedos pela manhã e observa que os anéis não estão entrando mais.
- As dores não aliviam completamente com o repouso.
- As vezes tem dor noturna.
- Tem problemas nas unhas e na pele há muitos anos. A dermatologista acha que é psoríase, mas ela sempre tratou as unhas como micose.

Artrite



Mensagens para Casa

1. Existem muitas formas de reumatismo. O seu médico saberá qual o seu tipo e o melhor tratamento.
2. Devemos estar atentos às mensagens emitidas pelo nosso corpo para fazermos o diagnóstico precoce das doenças.
3. Reumatismo tem controle e, muitas vezes, cura.
4. Em qualquer doença crônica o paciente deverá se engajar no tratamento proposto.

Obrigada pela atenção!!



Dra. Laura Maria Carvalho de Mendonça

Reumatologia e Doenças Osteometabólicas
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Titulada pela AMB em Reumatologia e Fisiatria
CRM RJ 52-46477-5

laura.reumato@yahoo.com.br

Rua Visconde de Pirajá, 351 sl. 522, Forum de Ipanema
Rua Dois de Dezembro 38, sl. 706

Ipanema (21)99 235 1818
Flamengo (21) 2558 6125

